

COMUNICACION

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS FORMICIDOS DE LA
PROVINCIA DE LA PAMPA. II.

Adriana A. CASADIO y Estela M. QUIRAN*

INTRODUCCION

El estado de conocimientos de la distribución de Formicidae (Insecta, Hymenóptera) en la Provincia de La Pampa, es aún escaso.

Quirán y Casadio (1988) realizaron la identificación y distribución geográfica de algunas citas nuevas de los Formicidos de la Provincia de La Pampa.

En la presente contribución se amplían las referencias de la fauna mirmecológica hallada en varias localidades de la Provincia.

MATERIALES Y METODOS

Se realizaron muestreos en las localidades de Victori-

* Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNLPam.

ca, Loventué y Bajo del Tigre; Winifreda y El Guanaco, - pertenecientes a las provincias biogeográficas del Monte y Pampeana, respectivamente.

El material estudiado corresponde a colecciones preparadas por las autoras, según el método descrito anteriormente (Quirán y Casadío, 1988); las que se depositaron en la cátedra Zoología de Invertebrados II, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

RESULTADOS:

A. Subfamilia Myrmicinae

Género Acromyrmex Mayr, 1865.

A. striatus (Roger, 1863): 48 obr, Winifreda, Loventué y Victorica, 21-XII-87; col. Estela Quirán y Adriana Casadío.

A. lobicornis Emery, 1887: 15 obr; Loventué, 21-XII-87 y El Guanaco, 15-IX-87; col. E. Quirán y A. Casadío.

Género Crematogaster Lund, 1831.

C. quadriformis Roger, 1863: 7 obreras; Winifreda, Loventué y Victorica; 21-XII-87; El Guanaco, 15-IX-87; col. E. Quirán y A. Casadío.

Género Pogonomyrmex Mayr, 1868.

P. inermis Forel, 1914: 13 obreras, 9 machos y 21 hembras; Victorica, 21-XII-87; col. E. Quirán y A. Casadío.

Género Epehebomyrmex Wheeler, 1902.

E. abdominalis Santschi, 1929*: 20 obreras; Loventué y Vic

torica; 21-XII-87; col. E. Quirán y A. Casadío.

Género Pheidole Westwood, 1841.

P. oglobini Kusnezov, 1951*: 1 obrera; Winifreda, 21-XII-87; col. E. Quirán y A. Casadío.

P. bergi Mayr, 1887: 30 obreras; Winifreda, 21-XII-87; - col. E. Quirán y A. Casadío.

P. bruchi Forel, 1914*: 1 obrera; Winifreda; 21-XII-87; col.E. Quirán y A. Casadío.

Género Solenopsis Westwood, 1841.

S. saevissima (Fr.Smith, 1855)*: 71 obreras;6 soldados,1 hembra; Winifreda, Loventué y Victorica, 21-XII-87 y El Guanaco, 15-IX-87; col.E. Quirán y A. Casadío.

S. interrupta Santschi, 1916*: 45 obreras, 5 soldados, Winifreda y Loventué, 21-XII-87; col. E. Quirán y A. Casadío.

Género Mycetarotes Emery, 1913.

Mycetarotes sp.: 7 obreras; Winifreda, 21-XII-87; col.E. E.Quirán y A. Casadío.

B.Subfamilia Formicinae

Género Camponotus Mayr, 1861.

C. tenuiscapus Roger, 1863*:43 obreras, 7 soldados,1 hembra; Winifreda, Loventué y Victorica, 21-XII-87; col. E. Quirán y A.Casadío.

C. mus Roger, 1863: 34 obreras; Victorica, 21-XII-87; col. A. Casadío y E. Quirán.

Género Prenolepis Mayr, 1861.

Prenolepis sp.: 4 hembras; Loventué, 21-XII-87; col. E. Quirán y A. Casadío.

C. Subfamilia Dolichoderinae

Género Conomyrma Forel, 1913.

C. breviscapis (Forel, 1912)*: 7 obreras; Winifreda y Loventué, 21-XII-87; col. A. Casadío y E. Quirán.

Conomyrma sp.: 1 hembra, 1 macho; Victorica, 21-XII-87; col. E. Quirán y A. Casadío.

Género Forelius Emery, 1888.

F. nigriventris Forel, 1912: 42 obreras; Winifreda y Victorica, 21-XII-87; El Tigre, 7-XII-87; col. E. Quirán y A. Casadío.

F. breviscapus Forel, 1913*: 7 obreras; Loventué, 21-XII-87; col. E. Quirán y A. Casadío.

Género Dorymyrmex Mayr, 1866.

D. pyramicus (Roger) Mayr, 1863*: 3 machos, 3 hembras; Loventué y Victorica; 21-XII-87; col. E. Quirán y A. Casadío.

Género Iridomyrmex Mayr, 1862.

I. humilis (Mayr, 1868): 24 obreras; Winifreda, Loventué y

Victorica, 21-XII-87; col. E. Quirán y A. Casadío.

D. Subfamilia Dorylinae.

Género Neivamyrmex Borgmeier, 1840.

N. dorbigni (Schuckard, 1840): 20 obreras, 7 soldados; El Guanaco, 15-IX-87; col. E. Quirán y A. Casadío.

CONCLUSIONES:

Se incorporan, como citas nuevas para la Provincia de La Pampa, 8 especies.

BIBLIOGRAFIA:

GALLARDO, A., 1916: Las Hormigas de la República Argentina. Subfamilia Dolichoderinas. An. Mus. Nac. de Hist. Nat. de Bs. As., tomo XXVIII:1-130.

KEMPF, W.W., 1972: Catálogo das Formigas Neotropicais. Studia Entomologica. Vol. XV: 1-344.

KUSNEZOV, N. 1951a: El género Camponotus en la Argentina. Acta zoológica Lilloana XII: 183-252, 3 láminas.

- - - - 1951 b: El género Pheidole en la Argentina. Acta Zoológica Lilloana XII:1-88.

- - - - 1951c: El género Pogonomyrmex Mayr. Acta Zoológica Lilloana XII: 227-333.

* Citas nuevas para la Provincia de La Pampa.

QUIRAN, E y A. CASADIO, 1988: Lista Preliminar anotada de los Formicidos de la Provincia de la Pampa. Rev. Fac. Agronomía. UNLPam. Vol. 3 n° 1:99-105.

SANTSCHI, F. 1916: Formicides sudamericanes nouveaux ou peu connus. Physis, 2:365-399.